

wenn mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft:

- Medio-lateral-oblique Aufnahme (MLO):
 - Brustparenchym unvollständig abgebildet
 - Pektoralismuskel nur am Rand erfasst
- Cranio-caudale Aufnahme (CC):
 - Größere Anteile des axillären Ausläufers nicht abgebildet und Mamille zeigt mehr als 20° nach lateral
- Unzureichende Beschriftung
 - Screening-Identifikationsnummer
 - Projektions- und Seitenangabe
 - Aufnahme datum
- Unterbelichtung oder erhebliche Überbelichtung oder unzureichender Kontrast
- Unzureichende Kompression
- Unschärfen durch Bewegung
- Artefakte, welche die diagnostische Aussage einschränken (z.B. durch Überlagerung anderer Körperstrukturen)
- Ausgeprägte Hautfalten, welche die diagnostische Aussage einschränken

trifft nicht zu

trifft zu

wenn alle folgenden Kriterien zutreffen:

- Medio-lateral-oblique Aufnahme (MLO):
 - Brustparenchym vollständig abgebildet
 - Pektoralismuskel relaxiert und bis in Höhe der Mamille abgebildet (Posterior-Nipple-Line „a“)
 - Pektoralismuskel im richtigen Winkel abgebildet ($> 20^\circ$)
 - Mamille im Profil abgebildet (Kriterium nicht anwendbar, wenn die Mamille sich nicht eindeutig darstellt)
- Inframammäre Falte dargestellt (Kriterium nicht anwendbar, wenn eine Darstellung aus anatomischen Gründen nicht möglich ist und dies dokumentiert ist)
- Cranio-caudale Aufnahme (CC):
 - Brustparenchym adäquat abgebildet (Posterior-Nipple-Line „b“; $b > a - 15 \text{ mm}$)
 - Mamille im Profil abgebildet (Kriterium nicht anwendbar, wenn die Mamille sich nicht eindeutig darstellt)
 - Mamille mittig oder leicht nach medial oder lateral zeigend ($< 20^\circ$)
- Axillärer Drüsenkörperanteil bis auf weit laterale Anteile vollständig abgebildet
- Symmetrische oder gering asymmetrische Aufnahmen

trifft nicht zu

trifft zu

Stufe II: Eingeschränkt (geringe Mängel)

Stufe I: Regelgerecht

Stufe III: Unzureichend (schwerwiegende Mängel)